

3^{ème} jour - Lundi 20 mai : les zones marneuses des puy dolomitiques au sud de Brive et en fin de journée les cultures sur sols sableux vers labrousse.

Les espèces particulièrement remarquables sont soulignées

Le matin : autour du Puy blanc (Alt. 310 m) Communes de Brive et Noailles, sur sol dolomitique marneux Prairie naturelle de fauche – lisières – fruticée :

Anacamptis pyramidalis
Blackstonia perfoliata
Bromospis erecta
Carex flacca
Carthamus mitissimus
Cervaria rivini
Cirsium acaulis
Cornus sanguinea
Euphorbia exigua
Filipendula vulgaris
Fraxinus excelsior
Gallium mollugo
Geranium dissectum
Helianthemum nummularium
Hippocrepis comosa
Himantoglossum hircinum
Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia = Senecio erucifolius
Jacobaea vulgaris
Lathyrus aphaca
Lathyrus latifolius
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Limodorum abortivum
Lotus corniculatus
Neotinea ustulata
Neottia ovata
Onobrychis viciifolia
Ophrys funerea
Ophrys insectifera
Ophrys scolopax
Orchis anthropophora
Orchis purpurea
Pilosella officinarum
Platanthera bifolia
Poterium sanguisorba
Prunus spinosa
Pulmonaria longifolia
Rhinanthus minor
Serapias lingua
Sorbus torminalis
Viburnum lantana
Trifolium ochroleucon

En bordure du champ cultivé :

Avenula pubescens
Buglossoides arvensis
Cyanus segetum
Filago vulgaris
Galeopsis angustifolia
Legousia speculum-veneris
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Ranunculus arvensis

Scandix pecten-veneris
Sonchus asper

En bordure de la prairie :

Gladiolus italicus
Muscari comosum
Prairie plus au nord :
Dianthus carthusianorum
Clinopodium acinos
Anacamptis morio
Rapistrum rugosum
Malva setigera =Althaea hirsuta
Linum catharticum
Brachypodium rupestre
Ophioglossum vulgatum
Lysimachia foemina=Anagallis foemina
Polygala calcarea
Helminthotheca echioides
Kickxia elatine
Chaenorrhinum minus

Zones dénudées sur sables et marnes

Anthericum liliago (en nombre)
Erica scoparia
Cervaria rivini
Plantago maritimus
Ancamptis laxiflora
Scorzonera humilis
Sisymbrella aspera
Taraxacum ciliare
Carex hirta
Carex leporina =Carex ovalis
Carex tomentosa
Carex hirta
Carex flacca
Carex divulsa
Carex spicata
Carex viridula subsp. brachyrrhyncha
Groenlandia densa
Cirsium tuberosum
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Pulicaria dysenterica

L'après-midi 1^{er} arrêt : Peuch Redon ,Puy Laborie sur Brive et Noailles; Pelouses sur sol dolomitiques gérées par le CEN Limousin

Acer monspessulanus
Asperula cynanchica
Carex halleriana
Carlina vulgaris
Carthamus mitissimus

Erica scoparia
Euphorbia cyparissias
Fumana procumbens
Globularia punctata
Hippocrepis comosa
Inula montana
Juniperus communis
Limodorum abortivum
Linum tenuifolium
Neotinea ustulata
Ophrys insectifera
Platanthera bifolia
Potentilla verna
Poterium sanguisorba
Rhaponticum coniferum subsp. coniferum = Leuzea conifera
Stachys recta
Staelhelia dubia (sur une zone rocheuse)

L'après midi : 2^{ème} arrêt Labrousse (sur Brive); bermes de la route Espèces des pelouses acidiphiles à thérophytes (un autre relevé a eu lieu le mercredi 22 mai lors d'un autre passage sur le secteur)

Aira caryophyllea
Anthoxanthum odoratum
Arnoseria minima
Chondrilla juncea
Cladanthus mixtus
Coincya monensis subsp. cheiranthos
Cyanus segetum
Helianthemum nummularium
Lathyrus angulatus
Legousia speculum-veneris
Linaria arvensis
Logfia gallica
Lycopsis arvensis
Medicago polymorpha
Micropyrum tenellum
Ornithopus compressus
Ornithopus perpusillus
Petrorhagia prolifera
Poa bulbosus
Potentilla argentea
Rorippa pyrenaica
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Sedum rupestre
Sherardia arvensis
Silene gallica
Teesdalia nudicaulis
Tolpis umbellata = Tolpis barbata
Trifolium dubium
Trifolium scabrum
Trifolium subterraneum
Trifolium glomeratum



Sisymbrella aspera



Anthericum liliago



Taraxacum ciliare



Gladiolus italicus



Cervaria rivini



Serapias lingua